


# Algoritmus na posudzovanie rizika COVID-19 na gynekologicko-pôrodnických oddeleniach a v pôrodniciach

Zodpovední za preklad: pracovná skupina GLOSS Slovakia SRH HRP WHO International (AK, LK)

Prevzaté z Kráľovskej spoločnosti pre pôrodnictvo a gynekológiu, marec 2020, aproximované pre podmienky Slovenskej republiky

Vhodné použiť ako  
evaluačný nástroj  
pri prvom kontakte  
pacientky pri vstupe  
do zdravotníckeho  
zariadenia



\* Pacient s akútnou infekciou dýchacích ciest (náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz a s anamnézou cestovania alebo pobytu v krajine / oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite počas 14 dní pred objavením sa symptómov; alebo pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19 alebo pacient so závažnou akútnou respiračnou infekciou (horúčka a aspoň jeden príznak respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a vyžadujúci hospitalizáciu (SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz.